

Todo Sobre el Implante Anticonceptivo

El implante es un tubo delgado, pequeño y suave que se coloca debajo de la piel del brazo para impedir el embarazo.

El implante contiene una hormona que impide que los óvulos de la mujer salgan de los ovarios. También espesa la mucosidad de la entrada al útero. Esto impide que el espermatozoides del hombre pueda entrar.

Family PACT
Planning • Access • Care • Treatment
OFFICE OF FAMILY PLANNING
CALIFORNIA DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
www.familypact.org
1-800-942-1054



El implante anticonceptivo mide 4 cm.

¿Cómo consigo un Implante?

Debe acudir a un médico especialmente capacitado. En el consultorio médico, le colocarán el implante debajo de la piel del brazo. Su médico del programa de Family PACT le ayudará a decidir cuál es el momento más oportuno para ponérselo.

¿Qué les gusta a las mujeres que lo usan?

- ◆ Dura 3 años.
- ◆ Es fácil de usarse.
- ◆ No se toma una píldora todos los días.
- ◆ Su uso pasa desapercibido.

¿Qué no les gusta a las mujeres?

- ◆ El implante provoca cambios en el período.
- ◆ El implante puede causar dolores de cabeza o acné. Pero, estos efectos no se presentan con frecuencia.
- ◆ Un médico debe ponerlo y quitarlo.
- ◆ Puede sentir el implante al aplicarle presión.
- ◆ Puede quedar una pequeña cicatriz por dónde se lo ponen.

¿Cómo funciona el Implante?

Debe ir con un médico para que le coloque el implante. Este implante suelta en el cuerpo la cantidad de hormona necesaria para impedir el embarazo.

El implante dura 3 años. A los 3 años, debe ir al médico para que le retire el implante o le inserte uno nuevo. Recuerde que puede pedir que se lo quiten en cualquier momento, y por cualquier razón.

¿Qué tan efectivo es?

El implante es muy eficaz para impedir el embarazo. Menos de 1 de cada 100 mujeres que usan el implante durante un año quedan embarazadas.



El implante se coloca debajo de la piel, en la parte superior del brazo de la mujer.

¿Cómo se coloca el Implante Anticonceptivo?

En general, colocar el implante toma menos de un minuto.

- ◆ Primero, se limpia la piel.
- ◆ Luego, se adormece la zona en la que se colocará el implante.
- ◆ Mediante un aparato especial, se introduce el implante debajo de la piel.

Le colocarán un curita para proteger el lugar por unos días.

¿Cómo se retira el Implante?

Quitar el implante toma menos de 5 minutos.

- ◆ Primero, se limpia y se adormece la piel que cubre el implante.
- ◆ Luego, se realiza un pequeño corte por donde se saca el implante.
- ◆ Si usted desea continuar usando un implante, puede pedir que le pongan un implante nuevo a través de ese mismo corte.

En cualquier momento puede solicitar que le quiten el implante. Se lo debe quitar a los 3 años.

¿Qué efectos secundarios tiene?

Todas las mujeres que usan el implante notan cambios en sus períodos. No hay manera de anticipar de qué forma cambiará el sangrado antes de que se coloque el implante.

- ◆ Usted no sabrá cuándo tendrá su período.
- ◆ Puede tener pequeños sangrados entre los períodos.
- ◆ Puede tener períodos más largos o más cortos.

Por estos cambios en el período, siempre tenga toallas femeninas a la mano. Otros efectos secundarios no frecuentes son acné, dolores de cabeza, aumento de peso, dolor en los senos y cambios de humor.

No se conoce ningún problema de salud mayor que el uso del implante haya causado.

¿Puede haber algún problema al colocar o quitar el Implante?

La mayoría de las mujeres no tienen ningún problema cuando les ponen o les quitan el implante.

Algunas mujeres sienten un tirón o presión cuando el implante se coloca o se quita. En el lugar donde se coloca el implante puede producirse un pequeño morete o un leve dolor hasta que sane.

En raras ocasiones, se producen otros problemas. En muy pocos casos, el implante se ha salido. Existe un riesgo mínimo de una infección en el lugar por donde le ponen o le quitan el implante.

El Implante no es el mejor método para todas las mujeres.

Antes de decidir usar el implante, hable con su médico de Family PACT acerca de cualquier problema de salud que pudiera tener.

Por ejemplo:

- ◆ Si tiene sangrado vaginal y no se sabe por qué.
- ◆ Si ha tenido problemas con coágulos de sangre.
- ◆ Si tiene o ha tenido cáncer de seno.
- ◆ Si tiene problemas del hígado.
- ◆ Si es alérgica a alguno de los componentes del implante.

El Implante Anticonceptivo no la protege contra el VIH (el virus que causa el SIDA) y otras infecciones que se contagian por contacto sexual.

Use condones (para hombre o mujer) cuando tenga relaciones sexuales para protegerse contra estas infecciones.