

Protéjase

- **Dígale(s) a su(s) pareja(s) que deben(n) recibir tratamiento para la gonorrea.** Si su pareja no recibe tratamiento, usted se podría contagiar de nuevo. Su proveedor de salud podrá darle consejo para que pueda ayudar a su pareja a conseguir tratamiento.
- **No tenga relaciones sexuales** hasta que pasen 7 días desde que usted y su(s) pareja(s) hayan terminado el tratamiento.
- **Repítase la prueba a los 3 meses** para averiguar si se ha contagiado de nuevo.
- **Use condones masculinos o femeninos cada vez que tenga relaciones sexuales.** Estos protegen contra la gonorrea. Su proveedor de Family PACT le ayudará a conseguir condones.
- **Tome decisiones sensatas.** Al estar bajo los efectos del alcohol o de las drogas podría actuar de forma riesgosa. Es posible que decida tener relaciones sexuales sin usar un condón.
- **Pregúntele a su proveedor de salud sobre las vacunas** que protegen contra la Hepatitis B y VPH.

Recursos

Para informarse más sobre la gonorrea, llame a la línea gratuita del CDC: 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636). Si desea más información sobre el programa de Family PACT y los proveedores cerca de usted, llame al 1-800-942-1054 o visite www.familypact.org.



© 2009 Departamento de Servicios de Salud, Oficina de Planificación Familiar. Todos los derechos reservados. Versión actualizada, 2017.

Las personas que aparecen en las fotografías son modelos. Estas fotografías se usan con fines de ilustración, únicamente. Si desea copias adicionales, visite el sitio: www.familypact.org

Para ver este documento en otro idioma, visite el sitio web www.familypact.org y elija el idioma que desee en la ventana "Select Language" localizada en la parte superior derecha de la página.

Home>Client> Education Materials **OF2710 Gonorrea SP**



Gonorrea

Lo que usted debe saber

¿Qué es la Gonorrea?

La gonorrea es una infección que afecta al cuello del útero en las mujeres. Las mujeres y los hombres también pueden presentar gonorrea en la uretra, la garganta o el ano. Es posible que usted no se sienta mal al principio, pero la gonorrea puede provocar graves problemas de salud más adelante.

Algunas personas no muestran ni señales ni síntomas de estar contagiadas.

Las mujeres podrían presentar algunos de los siguientes síntomas:

- Dolor o sensibilidad en el vientre o en los huesos de las caderas (pelvis).
- Dolor al tener relaciones sexuales
- Una mayor salida de fluidos de la vagina
- Sangrado entre periodos menstruales o al tener relaciones sexuales

Los hombres podrían presentar algunos de los siguientes síntomas:

- Salida de un fluido amarillo, blanco o verdoso del pene
- Dolor o inflamación en los testículos

Tanto las mujeres como los hombres podrían presentar algunos de los siguientes síntomas:

- Dolor o ardor al orinar
- Dolor de garganta
- Dolor al defecar.

¿Cómo me contagié?

Las personas se contagian de gonorrea al tener relaciones sexuales con alguien que ya esté contagiado. La mayoría de las personas contagiados de gonorrea no saben que lo están.

- No se puede saber si una persona tiene gonorrea con solo mirarla.
- La única manera de saber con certeza si usted tiene gonorrea es que un proveedor de salud le haga una prueba.

¿Qué debo hacer?

Obtenga tratamiento.

Su proveedor de Family PACT le dará la medicina que la(o) curarán.

¿Qué más debería saber?

Siga las instrucciones que le dé su proveedor de Family PACT:

- Asegúrese de que todas las personas con las que usted tuvo relaciones sexuales en los últimos 60 días reciban tratamiento. Pregúntele a su proveedor lo que su pareja debe hacer para recibir tratamiento.
- No tenga relaciones sexuales hasta después de que usted y su(s) pareja(s) hayan sido tratados.
- Espere 7 días después del tratamiento antes de tener relaciones sexuales.

Llame a su proveedor inmediatamente si usted:

- Empezara a tener vómitos 2 horas después de haber tomado la medicina.
- Le saliera un sarpullido en el cuerpo.

Visite de nuevo a su proveedor de Family PACT al pasar tres meses.

- Su proveedor le pedirá que regrese a hacerse otra prueba. Esto le permitirá a su proveedor saber si usted se volvió a contagiar de gonorrea.
- Su proveedor tal vez le pida que se haga pruebas para averiguar si tiene otras infecciones que se contagian al tener relaciones sexuales. Es posible tener más de una infección al mismo tiempo.
- Una persona con gonorrea tiene una mayor probabilidad de contagiarse del VIH o de contagiar a su pareja.

¿Por qué es importante recibir tratamiento

Si usted no recibiera tratamiento, se expone a:

- Contagiar a otras personas con las que tenga relaciones sexuales.
- Quedar estéril y no ser capaz de tener hijos en el futuro.

Las mujeres que no reciben tratamiento podrían presentar otros problemas, como:

- Tener una infección en las Trompas de Falopio. Esto se conoce como Enfermedad Inflamatoria de la Pelvis (PID, por sus siglas en inglés).
- Tener un embarazo en las Trompas de Falopio.
- Contagiar a su bebé al dar a luz, si estuvieran embarazadas. La gonorrea puede dañar los ojos y pulmones de los bebés.

Tomar las medicinas del tratamiento ayuda a evitar estos problemas. Asegúrese de que usted y su pareja reciban tratamiento.